

Rompiendo EL LAZO

La separación es un momento difícil, y más aun, cuando es de la mamá.

Afortunadamente, criadores de caballos de Cuarto de Milla alrededor de los

Estados Unidos quieren hacerlo más fácil, al compartir sus procedimientos de destete.

Por Jennifer K. Hancock

UNO HA ESPERADO 11 MESES PARA LA LLEGADA DE ESE NUEVO corredor. Y recuerda con especial agrado los detalles de la noche en que el potrillo nació – con excepción de algunos momentos borrosos a causa de la falta de sueño. Con la mirada perdida en las pasturas, uno ha observado orgullosamente como madre e hijo han creado ese lazo de unión. La yegua ha protegido a su bebé, le ha enseñado acerca de la vida fuera del vientre materno y hasta de pronto ha compartido con su cría, algunos secretos para ganar en la pista. Sin embargo, para ese potrillo pronto llegará la hora de encarar el mundo independientemente – es casi el momento para el destete.

Los caballos por naturaleza son animales de manadas, lo que hace entendible el que la separación cause estrés. Los caballos adultos que se han colocado juntos, a menudo muestran señales de ansiedad cuando son separados el uno del otro, lo que hace menos sorprendente que el alejamiento de un potrillo de su madre durante el destete, pueda ser una experiencia traumática. Sin embargo, no necesariamente tiene que ser así. De acuerdo con criadores de caballos de Cuarto de Milla alrededor del país, el destete puede ser un proceso casi libre de estrés.

Jerry Windham, Criador Campeón de AQHA y Antiguo Presidente de AQHA en College Station, Texas; Phillip Stewart, gerente general de Bob Moore Farms en Norman, Oklahoma; Jude Robicheaux de Robicheaux Ranch en Breaux Bridge, Louisiana; Ron Moosman de RM Stables en Lindon, Utah; Carrie Fales de Fales Ranch en Coolidge, Arizona, y Blane Schvaneveldt, doce veces Entrenador Campeón de AQHA y dueño de Blane Schvaneveldt Ranch en Romoland, California, comparten sus procedimientos de destete.

Con el Gran Corazón de Texas

EN SU RANCHO EN COLLEGE STATION, JERRY WINDHAM DESTETA entre 35 y 45 potrillos al año en pares, cuando estos tienen 5

meses de edad. Pero como en todos los aspectos cuando se trata de lidiar con caballos, no existen reglas fijas, ya que los caballos son tratados como individuos. Ocasionalmente, cuando una yegua no está produciendo suficiente leche, Windham desteta al potrillo antes. A sus potrillos no se les coloca el marco de madera que sólo les permite a estos pasar por debajo de él para buscar la alimentación y el agua, y que simultáneamente se lo impide a la yegua; en vez de eso, se les permite comer el grano con sus madres, dos veces al día.

“Hemos estado haciendo esto por años y años, y funciona muy bien,” dice él. “Dentro de un establo tenemos corrales para yeguas, los cuales son de 12 x 25 pies de diámetro, con un muro de concreto de 4 pies de alto y con malla encima de éste. Nosotros traemos dos potrillos y los ponemos juntos en la casilla del medio y en cada lado de ésta colocamos cada una de las yeguas. Uno coloca una yegua, dos potrillos y después la otra yegua.”

“Los potrillos entran allí y no extrañan ni una lamida,” agrega él. “Nosotros los ponemos allí, los empezamos a alimentar y les colocamos paja. Ellos van a comer y cuando quieren, miran por encima de la división y su mami está justo ahí. No más de 4 días después, nos llevamos las yeguas lejos de los bebés y ellos nunca las extrañan. No hay nada de estrés en ellos. Esto funciona maravillosamente.”

Con la yegua y el potrillo a la vista el uno del otro, estos no bordearán la cerca del pastizal, evitando así posibles lesiones.

Cada destete es alimentado en la mañana y al anochecer con dos libras de alimento del cual, el 16 por ciento es alimento granulado.

Para que los nuevos destetos no se vuelvan muy dependientes los unos de los otros, éstos son colocados en corrales separados y se les mantiene fuera de los pastizales por los próximos 15 a 20 días. Durante este tiempo, se les enseña el manejo de la cuerda.

“Al mismo tiempo que se destetan los potrillos, les colocamos el cabestro y los dejamos arrastrar la cuerda de mando,” dice él. “El día siguiente al destete, empezamos a meternos en sus corrales y atraparlos. Dejándolos arrastrar la cuerda de mando le es mucho más fácil a uno agarrarlos sin mucho problema. Los corrales son un sitio seguro para arrastrar la cuerda de mando, ya que no hay nada en lo que ésta pueda enredarse.”

Después de la primera semana alejados de sus mamás, los potrillos son soltados todos los días dentro de un cercado pequeño para que así estos se puedan acostumbrar a estar por sí solos en espacios más grandes. Después de dos o tres semanas de manejo diario y soltarlos afuera, los potrillos son colocados en un corral individual de más o menos un acre, en donde estos vivirán por algunas semanas. Cuando un grupo de aproximadamente 8 potrillos del mismo sexo es destetado, estos se agrupan y se colocan en un potrero más grande como grupo. En este momento potros y potras son separados.

La razón para no soltarlos inmediatamente afuera en los potreros grandes, es para estar seguro de que ellos están acostumbrados al cabestro.

“Nosotros los llevamos adentro y afuera de los establos todos los días, mientras los llevamos al corral pequeño al que los llevábamos al principio,” explica Windham.

“Nosotros los criamos en esos potreros, y es donde ellos están,” explica él. “Hasta que ellos están en buena condición para la venta, se les mantiene afuera, corriendo, jugando y haciendo todas las cosas que un caballo está supuesto a hacer. En mi opinión, es primordial criarlos de esa manera, ya que así estos se vuelven más competitivos los unos con los otros. Ellos pueden golpearse o hacerse cicatrices, pues estos potrillos pueden alborotarse jugando y peleando los unos con los otros, pero esa es justamente la manera en que yo creo que deben ser criados. Ellos son caballos y están aprendiendo las cosas que ellos necesitan saber.”

Cada destete es observado con mucha atención para asegurarse que cada potrillo se esté ajustando a su nueva etapa de vida.

“De vez en cuando tenemos que sacar a alguno ya que no se adapta a un grupo particular,” explica Windham. “Puede haber uno entre ellos que por alguna razón o por timidez no se acostumbra a estar entre los otros. Nosotros sacamos a ese destete de ese grupo y lo ponemos en otro potrero.”

Los Recién Llegados de Oklahoma

EN BOB MOORE FARMS EN NORMAN, OKLAHOMA, LOS POTRILLOS son destetados aproximadamente a los cuatro meses de edad. Pero las condiciones del clima pueden jugar un papel importante para decidir cuando hacerlo.

“Si está extremadamente caliente, generalmente no desteto,” dice Philip Stewart, el administrador del rancho. “Se los dejo a la yegua un poco más de tiempo o se los quito un poco más rápido.”

Las yeguas de Bob Moore Farms son reunidas en grupos de cuatro o cinco en un potrero y estos grupos son determinados por la edad de sus potrillos.

“Nosotros sacamos una o dos yeguas del potrero y dejamos

los potrillos allí,” explica Stewart, al hablar del destete. “Nosotros nos llevamos las yeguas hasta el otro lado del rancho. Un día o dos más tarde colocamos una o dos más yeguas fuera del potrero hasta que ya no quede ninguna en el potrero. Nosotros nunca cambiamos de sitio a los bebés hasta que ellos no hayan superado el estrés.”

“Yo no sé si eso es lo ideal,” agrega él, “pero lo que hacemos, ha trabajado bien para nosotros. No parece ser tan traumático para los potrillos, como lo sería separarlos de sus mamás y colocarlos en un establo solos o incluso con otro potrillo amigo. Para nosotros no es mucho problema destetar.”



Stewart piensa que los comederos para potrillos son una buena idea, pero él no los usa en el rancho porque hay un gran número de yeguas ajenas, yeguas que están de paso en el rancho para ser cruzadas. Durante la temporada de cruce, los caballos se están rotando a diferentes potreros y Stewart no quiere arriesgarse a que una yegua o un potrillo se lastime.

“Cuando nosotros destetamos – ya que hasta ese momento el sistema digestivo del potrillo se ha basado en leche – usamos granos para potrillos principiantes a base de leche,” dice Stewart. “Nosotros le agregamos eso al grano normal, porque ya para los cuatro meses, el potrillo estará comiendo grano con su madre. Cuánto de ese grano está actualmente siendo digerido, no lo sé – probablemente no mucho – pero ya para los cuatro meses, su sistema digestivo se está haciendo capaz de manejar granos y paja. Nosotros mezclamos las pastillas para potrillos principiantes con el grano regular por un período de tres semanas aproximadamente y después ya no les ponemos más las pastillas para potrillos principiantes. Para los cinco meses de edad, ellos ya están recibiendo raciones de grano y paja.”

Los potrillos continúan viviendo en sus potreros de cinco acres en grupos de cuatro o cinco. Después de que un grupo es destetado, los potrillos de ese potrero son llevados al rancho para vacunación y para cortar sus cascos.

“Después de la venta de añeros de septiembre, nosotros llevamos los bebés a los potreros, ellos estarán en el rancho por aproximadamente un mes, y allí los enseñamos al cabestro,” dice Stewart.

Durante su mes en el rancho, los destetos son también enseñados a ejercitarse en el redondel automático para amansar.

“Para la gente que tiene unas pocas yeguas, lo mejor es ponerle un cabestro a esos bebés desde el primer día y hacer

que sigan a sus madres a todos los lugares que ellas van," dice Stewart. "Yo creo que una buena manera de destetar es separar la yegua y el potrillo en corrales pequeños donde se puedan ver el uno al otro por un período de 2 a 3 horas al día y dejarlos que se acostumbren a estar separados. Después, continuar con eso por más de una semana e ir moviendo a la yegua un poco más lejos cada vez. Si uno tiene una pareja de bebés para destetar junta, ellos no extrañaran la mamá para nada. Además, también le dará a la yegua la oportunidad de secarse gradualmente y no por el contrario, de repente."

Una Luz en Louisiana

JUDE ROBICHEAUX MANEJA ROBICHEAUX RANCH EN LOUISIANA, donde se encuentran sementales como Some Dasher y Copper Buff entre otros. Robicheaux anualmente desteta aproximadamente 20 potrillos, haciéndolo en pares de cinco o seis meses de edad. Robicheaux dice que para él, en cuanto a las yeguas se refiere, *si están fuera de su vista, está fuera de su mente, esa es su filosofía.*

"Nosotros colocamos los potrillos en un establo en el rancho y nos llevamos a las yeguas a un lugar donde los potrillos no las puedan ver ni escuchar," dice él. "En ese momento empezamos a jugar con los potrillos y a acariciarlos."

Eso incluye acostumbrar el potrillo al cabestro.

"Cuando ellos están en el rancho, nosotros los acostumbramos al cabestro y los entrenamos en el redondel para amansar, los ejercitamos en el corral redondo y entonces los llevamos de vuelta en grupos," dice Robicheaux. "Yo traigo dos yeguas y dos bebés al rancho a la vez. Pongo dos bebés en un establo para que así tengan un compañero o amiguito y no se sientan aislados, y entonces me llevo las yeguas."

Ya que Robicheaux usa comederos para potrillos y estos están acostumbrados a tener comida disponible, él los alimenta tres veces al día y trata de mantener alfalfa y paja de pasto en frente de los potrillos. Los potrillos son alimentados con Nutrena Youth, la cual reciben también en los comederos para potrillos.

Cuando es tiempo para la pareja de potrillos de dejar el rancho, ellos son llevados afuera a un corral mediano de aproximadamente dos acres.

"Algunas veces colocamos un tercer o cuarto potrillo de más en el corral," dice él. "Los separamos por sexos – potras en un potrero y potros en otro."

Por las Montañas Sin Estrés

CADA AÑO RON MOOSMAN DESTETA UNA DOCENA DE POTRILLOS en su rancho en Utah, él prefiere destetar entre los cuatro y seis meses.

"Muchas veces depende de las condiciones en las que se encuentre la yegua," dice Moosman. "A veces tan tarde así, un potrillo puede hacer enfermar la yegua al demandar tanta leche de ella, pero depende de cómo las yeguas se estén sintiendo o la época del año, normalmente yo desteto entre los cuatro y los seis meses."

"Nos gusta sacar los potrillos para que coman buenos granos con sus madres, incluso aun, si esto significa tener que amarrar a la yegua y dejar que el potrillo coma algo de grano y paja," continúa él. "Cuando llega la hora del destete, nosotros simplemente nos llevamos la yegua lo más lejos posible para que así el uno no escuche al otro. Se ve mucho, que una vez los potrillos están comiendo grano, ellos nunca extrañan sus

mamás – ellos simplemente se van directamente a donde está su comida. Otra cosa que nos gusta hacer es destetarlos con otros potrillos."

Los potrillos de Moosman están acostumbrados al cabestro mientras ellos todavía están con sus mamás.

"Por razones de estrés, a nosotros normalmente no nos gusta meternos con un potrillo hasta que no tenga siquiera una semana de edad," explica Moosman. "Nos gusta tenerlos y contemplarlos a los dos o tres días. Usualmente, nos gusta esperar hasta que tengan un poco más de edad para ponerles un cabestro y tratar de llevarlos de la cuerda."

Moosman comienza a levantar las patas de los potrillos tan pronto comienza a acostumbrarlos al cabestro.

En cuanto a los comederos para potrillos, Moosman prefiere no usarlos.

"Nosotros tenemos un gran campo, y ponemos a todas nuestras yeguas y potrillos afuera juntos," dice él. "Nosotros sentimos que ellos están recibiendo todo lo que necesitan, si están en un buen potrero con buen pasto y las yeguas están lactando correctamente. Si el pasto del potrero no es bueno, entonces uno debe recurrir al uso de un comedero para potrillos y alimentar también a la yegua."

Trato Caluroso

EN EL RANCHO DE RALPH Y CARRIE FALES IN ARIZONA, DONDE se encuentra Heza Motor Scooter, los Fales usualmente destetan entre 50 y 60 potrillos al año. Ellos destetan sus bebés entre los cuatro y seis meses de edad. Pero Carrie aclara que esto depende del bebé y de la yegua.

"Nosotros realizamos un destete gradual," dice Carrie. "Llevamos nuestras yeguas y bebés afuera y los colocamos en corrales, con un corral entre ellos. Después nos llevamos los bebés lejos por un par de horas al día y los colocamos en el corral del medio para que puedan estar enseguida de sus mamás, y así el uno se sienta cerca del otro, aunque estén separados."

Ellos continúan haciendo esto aproximadamente por cinco días.

"Cuando ellos se han hecho amigos con otros potrillos, nosotros proseguimos a llevarnos a las yeguas de regreso afuera," dice ella. "Nosotros hemos encontrado que eso es mucho menos traumático y mucho más fácil para todos. Nosotros no notamos mucho estrés causado por el destete."

Los Fales no usan comederos para potrillos, pero a causa del desbalance de fósforo y calcio en el suelo de Arizona, ellos usan un suplemento alimenticio que es formulado para su paja.

"Arizona es conocido por los problemas con epifisitis," dice ella. "Pero nosotros no hemos tenido ningún problema. Nosotros alimentamos con un alimento dulce y alfalfa de muy buena calidad. Ellos están afuera en pasto Bermuda o en una mezcla de alfalfa y paja Bermuda."

Epifisitis es un problema que ocurre en las placas de crecimiento al extremo de los huesos largos de los caballos jóvenes, el cual puede causarles dolor y hacerlos cojear. Otros términos usados para describir esta condición son displasia y displasia fisial. Epifisitis es una de las enfermedades del desarrollo ortopédico y puede ser causada por bajos niveles de calcio, fósforo, proteínas, zinc y cobre en la dieta alimenticia, o situaciones de desbalance alimenticio como excesivas cantidades de zinc o calcio, o altos porcentajes de calcio o fósforo.

Los Fales acostumbran al cabestro a sus potrillos mucho antes del tiempo de destete.

"Para el momento en que vamos a destetar a nuestros bebés,



ellos ya están prácticamente acostumbrados al cabestro," dice Fales. "Cuando las yeguas llegan para ser cruzadas, nuestros bebés están todos enseñados a dejarse mover del cabestro en los cajones. Todos ellos llevan cabestros para potrillos, así ellos están muy acostumbrados al cabestro para cuando se destetan."

"Una vez que la destetada es completada, nosotros dejamos salir primero a las yeguas," dice ella. "Dejamos los bebés trabajando por 30 días y los ponemos en el redondel para amansar y se les maneja muchísimo. Ellos son todos amables y se dejan trabajar ya destetados, después ellos reciben un mes completo de entrenamiento para potrillos."

Comienzos Dorados

EN LA COSTA OESTE, BLANE SCHVANEVELDT DESTETA APROXIMADAMENTE 85 POTRILLOS AL AÑO.

"Nosotros tenemos grandes establos para yeguas en el rancho, y ponemos al bebé en el establo al lado de la yegua," dice Schvaneveldt. "Los dejamos en los establos por dos o tres días y gradualmente les quitamos los bebés a las yeguas. Ellos usualmente se destetan muy fácil, pero si los potrillos están nerviosos, los ponemos juntos en un establo."


Schvaneveldt utiliza los comederos para potrillos para

acostumbrar al potrillo al grano. En los potreros, los potrillos son alimentados con avena en los comederos para potrillos.

"Cuando destetamos, enseñamos al potrillo a usar el redondel para amansar y también el cabestro," dice él.

"Nosotros mantenemos el desteto trabajando y lo caminamos en el redondel para amansar, y también trabajamos con él para que se acostumbre el cabestro durante más o menos un mes," dice él. "Cuando conseguimos un grupo de aproximadamente 10, los ponemos afuera en un potrero más grande. Ponemos las potras en uno y los potros en otro. Tenemos un buen número de diferentes corrales y así colocamos entre 10 y 12 destetos juntos. También tenemos otros corrales más pequeños donde colocamos cuatro o cinco juntos."

Mezcle y Empareje

CADA CRIADOR TIENE SU PROPIA RUTINA PARA DESTETAR, pero todos comparten la misma meta: hacer del proceso lo más libre posible de estrés para la yegua, el potrillo y el caballero. Mientras evalúa su propio programa de destete, usted puede considerar el incorporar una o más de las anteriores prácticas. El eliminar el trauma del proceso del destete le permitirá a su potrillo el continuar creciendo hasta alcanzar su potencial completo. 

INYECCIONES DE SALUD

Para los humanos, los chequeos regulares con el pediatra son llamados "controles de crecimiento infantil." Durante estas citas médicas un bebé normalmente recibe sus vacunas. Nuestro panel de expertos opinan que los potrillos necesitan también esas visitas de control para vacunación.

Jerry Windham vacuna y desparasita a los 30, 60, 90, 120 y 150 días.

"Nosotros tratamos siempre de vacunar antes del período del destete y de esa manera no tenerles que poner una vacuna la primera vez que los destetamos," dice Windham. "Después, entre los 15 y los 20 días posteriores al destete y antes de soltarlos, les haremos un seguimiento para su próxima vacunación y desparasitada. Nosotros tratamos de no chuzarlos desde muy temprano con jeringas."

Cada 60 días en Bob Moore Farms, los potrillos son desparasitados, y reciben las vacunas para la rinoneumonitis, la influenza equina, y el estreptococo equino.

"A los 30 días de nacidos, los colocamos sus primeras vacunas contra el "West Nile" (Virus del Oeste del Nilo), rino, y estreptococo," dice Phillip Stewart. "De tres a cuatro semanas después, procedemos a colocarles otra vacuna contra el "West Nile". De ahí se suministra en ciclos de 60 días hasta que sean añeros, y en ese momento se cambia a ciclos de 90 días."

En Louisiana, con sus abundantes recursos de agua y mosquitos, no se toma ningún riesgo con el "West Nile".

"Nuestros potrillos son vacunados contra el estreptococo y el "West Nile" – de seguro, sabiendo donde estamos – a los cinco meses," dice Jude Robicheaux. "A los cinco meses también los vacunamos con una 4 en I para la encefalitis del Este y del Oeste, gripe, rino y tétano."

En Utah, Ron Moosman tiene sus potrillos en un programa regular tanto de desparasitación, como de vacunación también.

"A nosotros normalmente nos gusta desparasitar nuestros potrillos a los tres meses, antes de que se lo quitemos a la yegua, y después los desparasitamos de nuevo, un mes después al destete," dice Moosman. "Nosotros los vacunamos mientras están aun con la

yegua y entonces 30 días después del destete los vacunamos otra vez. No queremos ponerlos en más cosas, mientras están en el período del estrés de la destetada."

La primera vacunación para los potrillos en el rancho de Fales es administrada a las 12 semanas de edad.

"Nosotros somos realmente rigurosos en lo que respecta al estreptococo, ya que ha habido una gran proliferación de la enfermedad alrededor del país por el último par de años. Nosotros comenzamos con su primera vacuna para el estreptococo a las 12 semanas," dice Carrie Fales.

En cuanto a la desparasitada, los potrillos de los Fales son desparasitados por primera vez a las seis semanas de edad. En California, Blane Schvaneveldt desparasita a sus potrillos a las seis semanas y también les suministra otra dosis cada 60 días. Schvaneveldt también les suministra a sus potrillos una vacuna para la gripe y rino cada tres meses.

Los expertos hacen énfasis también en la importancia del cuidado temprano de los cascos de estos futuros corredores.

"Si uno considera que alguno necesita un corte correctivo de cascos, uno debe hacerlo durante los primeros tres meses de su vida," advierte Moosman. "Una vez esos huesos están en posición, ya es muy poco lo que uno puede cambiar en ellos."

En el Bob Moore Farms a los potrillos se les corta los cascos a los 60 días, y de ahí, se continúa cortándoseles en períodos regulares.

"Los períodos para cuidado de los cascos varían con cada bebé," dice Fales, refiriéndose a sus procedimientos en Arizona. "Nuestro suelo es muy suave aquí, lo que hace que les cortemos los cascos cuando todavía están con la yegua y desde entonces se les hace entre cada seis y ocho semanas, depende de lo que necesiten."

The above article appeared in English in the May 2003 issue of The American Quarter Horse Racing Journal. Visit www.aqharacing.com and log onto the Subscribers Services Area to view the article.